

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DEP - S - G - 00183934

ISSN 0294 - 4650



Charente

PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13 ROUTE DE LA FORET BIARD - 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02

BULLETIN N° 9 (3/83) du 6 Juin 1983

Les céréales sont à 50 % en cours de floraison : c'est la période critique pour décider des dernières protections. Les traitements tardifs ne sont intéressants que lors d'une maturation lente et prolongée. En pratique, on considère que la fin floraison est la dernière limite pour traiter.

PUCERONS DES EPIS :

Très peu de parcelles sont actuellement envahies par les pucerons : le seuil d'un épi sur 2 colonisé est atteint dans moins de 10 % des cas. Après la mi-floraison, il faut des infestations encore plus importantes pour qu'un traitement soit nécessaire.

MALADIES :

La rouille brune est fréquemment présente sur l'étage foliaire n° 2. On observe des situations plus atteintes en Nord Charente qu'en Sud Charente. Le temps chaud est très favorable à l'évolution de la rouille brune. Si le traitement d'épiaison n'a pas été fait avec un produit à bonne persistance sur rouille brune, un renouvellement peut être nécessaire.

CECIDOMYIE DES FLEURS :

Le temps calme et chaud qui règne actuellement est favorable à l'activité des cécidomyies. Si l'on observe le soir la présence de ces moucheron en train de pondre, une protection s'avère utile. Ne plus intervenir après la floraison.

Imprimé à la Station le 6 Juin 1983

Précédente Note : Bulletin N° 8 du 13 Mai 1983